

Variétés à chair ferme

Si 80% des tubercules
> 25mm

25 mm

Le bon moment pour utiliser **FAZOR® STAR** 5KG/ha

Avec FAZOR® STAR



Augmentez la dormance de vos
pommes de terre au stockage



Maîtrisez la date de la première
nébulisation




Contrôlez les repousses des
tubercules dans vos cultures
suivantes



Variétés de transformation

Si 80% des tubercules
> 35mm

35 mm



Bien appliquer
FAZOR® STAR

35 mm



Traiter impérativement sur une végétation active en bon état sanitaire et hors situation de stress



Respecter un minimum de 3 semaines entre l'application et le défanage



Privilégier un volume de bouillie entre 150L/ha et 300L/ha



Ne pas traiter en cas de fortes chaleurs ($T^{\circ} > 25^{\circ}\text{C}$) ou si les températures annoncées dans les heures qui suivent le traitement risquent d'être supérieures à 35°C



Tenir compte du risque de pluviométrie après traitement (24h)

25 mm

UPL France - Tour Voltaire - 2ème étage - 1 place des Degrés - 92800 PUTEAUX - Tél. : 01 46 35 92 00 - e-mail : contact.uplfrance@upl-ltd.com - fr.uplonline.com
En savoir plus sur : www.upl-ltd.com/fr



FAZOR® STAR : AMM n°8400425 – composition du produit : hydrazide maléique 600 g/kg (60% p/p) (804 g/kg sous forme de sel de potassium) @ marque déposée Arysta Lifescience Great Britain LTD. H411 : toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS - UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

FORME DE DECOUPE RECTO